

Motýlí keř

Buddleja davidii



Buddleja davidii řadíme do čeledi krtičníkovité (Scrophulariaceae). Pochází ze střední a jihozápadní Číny, kde roste v nadmořských výškách až okolo 3 500 m.

Průmyslová revoluce v Evropě vedla k růstu střední třídy, a tím i k rozmachu zahradničení jako volnočasové aktivity. V okolí evropských měst přibývaly soukromé zahrady. Ve viktoriánské době bylo módní vysazovat do zahrad exotické druhy a tehdy se téměř neřešilo, jak zabránit jejich šíření mimo zahrady. Jen malá část druhů zavlečených z Dálného východu dokázala dlouhodobě přežívat i mimo zahrady a arboreta. Jedním z nich byla právě *B. davidii*.



Buddleja davidii
'Summer Bird Midnight Blue'

Několik druhů komulí, včetně *B. davidii*, bylo do Evropy přivezeno koncem 19. století a do konce století se z nich staly oblíbené okrasné keře v anglických zahradách.

5 důvodů proč si vysadit motýlí keř

1. Magnet na motýly

Kvetoucí komule přiláká spoustu motýlů, včel i čmeláků.

2. Kvetě dlouho a bohatě

Laty květů drží celé léto a často i do podzimu. Odstraňujte odkvetlá květenství, podpoříte tvorbu nových.

3. Snadná údržba díky jarnímu řezu

U většiny běžných komulí (*B. davidii*) stačí na jaře výrazně seříznout.

4. Hodí se i do malé zahrady a na terasu

Existují zakrslé komule do 1 m (např. série Summer Bird, které jsou skvělé do předzahrádky, k chodníku nebo do větší nádoby.

5. Zvládá slunce a sušší podmínky

Snáší horko a sucho lépe než spousta jiných keřů.



Buddleja davidii 'White Profusion'

5 nejčastějších otázek

1. Kam komuli vysadit, aby co nejvíc kvetla?

Na plné slunce a do propustné půdy. Ve stínu kvete méně a v těžké, přemokřené zemi může unívat.

2. Kdy a jak stříhat motýlí keř?

Motýlí keř kvete na letorostech. Stříhejte ho razantně na jaře (březen–duben). Zkratte výhony zhruba na 20–40 cm. Pozdní jarní mrazíky mohou spálit listy. Brzy však obráží.

3. Proč mi komule nekvete nebo kvete málo?

Nejčastějším důvodem je nedostatek slunce nebo slabé jarní seříznutí. Motýlí keř nepotřebuje hnojení. Určitě ho nehnojte dusíkatým hnojivem.

4. Dá se pěstovat komule v květináči?

Ano, zakrslé kultivary, které dorůstají do 1 m. Potřebuje větší nádobu, drenáž, pravidelnou zálivku v létě. V zimě je dobré květináč izolovat, aby kořeny nepromrzly.

5. Jak se starat o motýlí keř během sezóny

Odstraňuje odkvetlá květenství. Podpoříte tvorbu nových a zároveň zabráníte tvorbě semen (motýlí keř se může v příznivých podmínkách šířit samovýsevem).

Na co si dát pozor

Zplanělé populace *B. davidii* se po 2. světové válce výrazně rozšířily, hlavně ve městech Velké Británie. Bombardované plochy a stavební suť představovaly ideální narušené stanoviště, kde se rychle vytvářely husté porosty.

V 50. a 60. letech se ve Velké Británii komule stala velmi populární zahradní dřevinou. Po roce 1945 se komule zřejmě šířila nejprve podél železnic, semena mohla být přepravována na vlcích nebo je proudění vzduchu projíždějících vlaků vtahovalo a neslo dál. Štěrkový a kamenitý násep byl pro jejich uchycení velmi vhodný. Tratě bez pravidelné údržby šíření urychlovaly. Srovnání rozšíření v UK mezi roky 1984 a 2008 uvádí nárůst výskytu o 83.

V Evropě je rozšíření *B. davidii* popisováno od Středomoří po Bergen v Norsku a od Španělska až po Bulharsko.

Samovýsevu motýlího keře zabráníte odstraněním odkvetlých květenství. Nebudou se tvořit semena a nehrozí rozšíření komule do okolí.



Buddleia weyeriana ,Sungold'

Není jen Komule Davidova

Nejběžnější v našich zahradách je Buddleja davidii – komule Davidova. Existuje však několik desítek dalších buddlejí, např.:

- Buddleja alternifolia – komule střídavolistá, obloukovité větve, kvete na loňském dřevě – řeže se jinak než B. davidii.
- Buddleja globosa – komule kulovitá, typické oranžové kuličky květů.
- Buddleja × weyeriana – často žluté až meruňkové odstíny, např. 'Sungold', 'Honeycomb'.
- Buddleja officinalis – časněji kvetoucí druh, u nás raritní.
- Buddleja colvilei – velké růžové květy, spíš pro mírnější polohy/chráněná místa.
- Buddleja lindleyana – fialové převislé hrozny, méně častá.
- Buddleja madagascariensis – teplomilná.