Čechrava

Astilbe



Čechrava (lat. Astilbe) pochází z východní Asie, zejména z Japonska, Číny a Koreje a ze severoamerického kontinentu, kde roste podél lesních potoků a na vlhkých, humózních půdách v polostínu.

Botanicky patří do čeledi lomikamenovité (Saxifragaceae). Do Evropy se dostala v 19. století a díky šlechtění dnes existují stovky kultivarů, které se liší výškou, barvou i tvarem květenství.



Astilbe chinensis ‚Hot Pearls'

Čechrava tvoří husté trsy zpeřených, na okrajích zubatých listů, které mají často nádech do bronzova nebo do tmavě zelené barvy s červenavým leskem.

Nad listovou růžicí vyrůstají v létě (od června do srpna) vzpřímená latovitá nebo chocholičnatá květenství složená z drobných peříčkovitých kvítků.

Barevná škála je široká, od čistě bílé přes růžovou a lososovou až po sytě červenou a purpurovou. Odkvetlá květenství zůstávají na rostlině pěkně tvarovaná i po zaschnutí a zdobí záhon do podzimu. Výška se pohybuje od nízkých kultivarů kolem 20–30 cm až po statné druhy přesahující 100 cm.



Astilbe chinensis ‚Visions in Red'

Jak pěstovat čechravu

Čechrava je poměrně náročná na vlhkost.

- Vyžaduje polostín až stín, snese i slunnější místo, pokud má dostatek vláhy.
- Půda musí být humózní, propustná, trvale vlhká. Čechrava je vyloženě vlhkomilná rostlina a v suchu velmi rychle chřadne.
- Zálivka je v závislosti na vlhkosti půdy nutná pravidelná a vydatná, zejména v létě. Půda nesmí vyschnout.
- Ocení jarní přihnojení kompostem nebo vyzrálým hnojem.
- Vrstva kůry nebo listí kolem trsu pomáhá udržet vlhkost a zabraňuje vysychání kořenů. Není vhodná do štěrkového záhonu.
- Odkvetlá květenství můžete nechat přes zimu, jsou dekorativní. Sestřihněte až na jaře.
- Množte dělením trsů na jaře nebo na podzim, nejlépe každé 3–4 roky. Rostlinu tím zároveň omladíte.
- Je plně mrazuvzdorná, žádnou ochranu nevyžaduje.

S čím čechravu kombinovat na záhonu

Čechrava má výraznou vertikální strukturu květenství, takže skvěle doplňuje rostliny rostoucí do plochy nebo s jednodušší texturou. Doporučujeme kombinovat ji s:

- Bohyškami (Hosta) – jejich velké listy vytvoří kontrast k jemným latám čechravy a obě rostliny mají podobné nároky na stanoviště.
- Kapradinami – vytvoří přirozeně působícím lesní atmosféru.
- Náprstníkem (Digitalis) – pro sytější barevné akcenty ve vlhčím polostínu.
- Popelivkou nebo rodgersií (Ligularia, Rodgersia) – velkolisté trvalky vytvoří s čechravou efektní kontrast textur na vlhčím stanovišti.
- Ostřicemi a bikou (Carex, Luzula) – dodají kompozici lehkost.



Astilbe arendsii ‚Astary Mix'

Nejznámější druhy čechrav

Astilbe japonica (čechrava japonská)
Nižší až středně vysoký druh (30–60 cm) pocházející z Japonska. Kvete jako jedna z prvních, už od května až června. Má hustá, kompaktní chocholičnatá květenství, nejčastěji v bílé, růžové nebo červené barvě. Listy jsou lesklé, tmavě zelené. Díky časnému a bohatému kvetení i kompaktnímu vzrůstu je oblíbená do menších záhonů a nádob.

Astilbe chinensis (čechrava čínská)
Pochází z Číny a je ze všech druhů nejodolnější vůči suchu. Potřebuje vlhko, snese však občasné výkyvy lépe než ostatní druhy. Kvete později, v červenci až srpnu, a má užší, vzpřímenější a hustší latovitá květenství, často v odstínech růžové až fialové.

Astilbe × arendsii (čechrava Arendsova)
Jde o rozsáhlou skupinu hybridů vyšlechtěných na přelomu 19. a 20. století německým šlechtitelem Georgem Arendsem křížením několika asijských druhů (mimo jiné A. japonica, A. chinensis a A. thunbergii). Právě z této skupiny pochází naprostá většina dnes pěstovaných zahradních odrůd. Vyznačuje se velkou variabilitou výšky (40–100 cm), tvaru květenství i barvy – od bílé přes lososovou a růžovou až po sytě červenou a purpurovou. Kvete zpravidla v hlavní letní sezóně, od června do srpna, a je považována za nejvšestrannější a nejodolnější skupinu pro běžné zahradní použití.

Astilbe thunbergii (čechrava Thunbergova)
Pochází z Japonska a je jedním z vyšších druhů čechrav, dorůstá 60–100 cm. Charakteristická je svým volným, obloukovitě převislým květenstvím – na rozdíl od vzpřímených, hustých lat arendsijských hybridů působí latky thunbergii elegantněji a rozvolněněji, což jí dodává lehčí, přirozenější vzhled. Kvete později v sezóně, obvykle v červenci až srpnu, nejčastěji v bílé nebo světle růžové barvě. Právě tento druh byl spolu s A. japonica a A. chinensis jedním z výchozích druhů pro křížení Arendsových hybridů, takže v mnoha moderních odrůdách najdeme právě jeho vzdušný, obloukovitý charakter květenství.



Astilbe arendsii ‚Astary Mix'